

Свиноносая черепаха, *Carettochelys  
insculpta* Ramsay, 1886  
**Обзор вида и ошибки в содержании**




Ведущий зоотехник  
ГУК ТО «Тульский  
областной  
Экзотариум»  
Змеева Д.В.

**Англ:** Pig-nosed Turtle,  
Pitted-Shelled Turtle,  
Warrajan

**Семейство:**  
*Carettochelyidae*

**Ареал:** Папуа-Новая  
Гвинея (реки Флай,  
Стрикленд, Морхед,  
Лоренц, Стеква, озеро  
Джамур). Австралия  
(Дейли, Виктория,  
водосборы Аллигаторов на  
Северной территории)



Размер 56,3 см. Вес  
22,5 кг.

В неволе редко  
встречаются особи  
больше 35 см.



Fêmea com 10 anos, 25cm e 3,3 kg



Macho com 10 anos, 24cm e 2,6 kg.



Температура воды 28-30°C  
pH от 8,0 до 8,3.  
KH и GH 18 до 25 dH.

Для профилактики грибковых инфекций, время от времени (раз в квартал, например), можно подсаливать воду из расчета 1 чайная ложка на каждый 15–20 литров

Подмена воды 1 раз в неделю. Не реже 1 раза в 3 недели. Частота подмен зависит от объема вашего аквариума и размера животного.

Минимальный объем для малыша (меньше 15 см) 150 л, дальше объем увеличивается. Для взрослой черепахи (длиной от 25 см) 2000 - 3000л



# Кормление:

Соотношение животного и растительного корма 1:2

**Корма растительного происхождения:** одуванчик, зелень (салат листовой), сырой шпинат, морковь, цикорий, кабачки, помидоры.

Фрукты: груши, яблоки, зеленый инжир, виноград, киви, бананы и абрикосы. Гранулированный корм для черепах.

**Корма животного происхождения:** мелкая целая рыба (уклейка, гольяны, каспийская корюшка и др.), треска, дождевые черви, курица, крабовое мясо, креветки, говядина, вареный яичный белок

# Размножение


Половая зрелость у самок наступает в 18 лет, у самцов в 16, при длине панциря от 30 см.

В неволе, по нашим данным, есть 2 случая разведения: в зоопарке Бронкса, Нью-Йорк и Зоологический сад Вильгельма, Штутгарт).

Беременность длится около 2 месяцев. Откладка яиц в дикой природе происходит в конце сухого сезона. Обычно на песчаных отмелях, примерно в полуметре от воды.



Гнездовая камера в диаметре около 20 см. Количество яиц в кладке в среднем 7 – 19 (максимум 39). Диаметр яйца 38 мм. Самка может сделать до 2-х кладок в год.




Как и у всех черепах, температура инкубации влияет на пол потомства. При константе 32 °С вылупляется оба пола. При более низких температурах (27,7 - 30) вылупляются самцы, при более высоких (>32) самки. Инкубационный период 60 - 70 дней.

# Охранный статус и международная торговля

Статус в МСОП: VU «Находятся в уязвимом положении» (уязвимые виды)

В 2005 году черепахи были внесены во 2-ое приложение СИТЕС.







Собираются как взрослые особи, так и их яйца, потребляется и продается по всему ареалу в Папуа-Новом Гвинее и Австралии. Только на рынке Кикори с октября 1980 г. по февраль 1981 г. было продано более 5000 яиц. В следующем году было получено более 20 000 яиц.

С 90-ых годов местное население поняло, что торговать этими яйцами на рынках не очень эффективно. И занялось активным сбором яиц, инкубированием их на фермах и последующей продажей на международный рынок, легальный и не очень...



Photo credit: Ron Lilley

# «Glass Turtle» («Стеклянная черепаха»)



Спасибо за внимание!



Photo credit: Kadhorie Farm & Botanic Garden

## **Электронные ресурсы:**

<http://www.carettochelys.com/carettochelys/distribution.htm>

<http://tartarugas.atlasvirtual.com.br/tartaruganarizdeporco.htm>

<https://reptile->

[database.reptarium.cz/species?genus=Carettochelys&species=insculpta&search\\_param=%28%28taxon%3D%27Carettochelyidae%27%29%29](https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Carettochelys&species=insculpta&search_param=%28%28taxon%3D%27Carettochelyidae%27%29%29)

<http://www.carettochelys.com/carettochelys/food.htm>

[http://www.austinsturtlepage.com/Care/caresheet-fly\\_river\\_turtle.htm](http://www.austinsturtlepage.com/Care/caresheet-fly_river_turtle.htm)

## **Список литературы:**

1.Barone Stefano. The Pig-Nosed Turtle, Underwater Glider. Reptilia Magazine. pp 56 – 60

2.Georges Arthur , Doody J. Sean , Eisemberg Carla , Alacs Erika A. , and Rose Mark . Carettochelys insculpta Ramsay 1886 – Pig-Nosed Turtle, Fly River Turtle. Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises. Chelonian Research Monographs (ISSN 1088-7105) No. 5, doi:10.3854/crm.5.009.insculpta.v1.2008